

## Frisk som få!

Ny rågvete med polskt ursprung som särskilt utmärker sig för sin goda sjukdomsresistens. Sorten har utmärkt stråstyrka och mycket god kärnkvalitet, men mognar senare än mätaren.



## Avkastning

### Obehandlat

	A	B	C	F	A-G
Tritikon, kg/ha	7380	7530	7480	7020	7430
Borwo	114	104	108	130	110

### Behandlat

	A	B	C	F	A-G
Tritikon, kg/ha	7930	7910	8180	7640	7740
Borwo	109	104	109	117	107

### Merskörd vid behandling med svamppreparat

	A	B	C	F	A-G
Tritikon, kg/ha	+550	+380	+700	+620	+310
Borwo	+200	+460	+790	+/-0	+80

Officiella försök 2009, rel.tal jämfört med Tritikon, område A-G. Merskörd vid behandling med svamppreparat i kg/ha.

## Odlingsegenskaper

2009	Tritikon	Borwo
Rymdvikt, g/l	706	+25
Stråstyrka, 100-0	90	+7
Strålägg, cm	105	-13
Mognad, dagar	317	+5
Vinterhärdighet, %	94	-2
Tusenkorntvikt, g	45,0	+0,6
Protein, % av ts	12,9	-1,4

Källa: Officiella försök 2009, Stråbrytning: 100-0, 0 = bäst. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd.

## Kärnavkastning årsvis

Sort	Område A-C					Område D-G				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Tritikon (kg/ha)	7160	6860	6880	8190	7760	6720	7000	8100	9060	7840
Rel.tal 100.										
Borwo	-	-	-	-	107	-	-	-	-	110

Källa: Officiella försök 2005-2009, medeltal obehandlat-behandlat, mätare Tritikon.

# RÅGVETE